



# AGENOR® 450 SL

## herbicydyd

### PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

Dolistny herbicydyd o działaniu systemicznym. Pobierany poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), przemieszczany w całej roślinie dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 4 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

### Herbicydyd zawierający glifosat

#### Chwasty wrażliwe na środek w dawce w 4,0 l/ha:

fioltek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostrożeń polny, perz właściwy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina łąkowa, wiechlina roczna, życica trwała.

#### Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce w 4,0 l/ha:

koniczyna polna, mniszek pospolity, szczyr roczny, żóltlica drobnokwiatowa.

#### Chwasty średnio odporne na środek w dawce w 4,0 l/ha:

szczaw zwyczajny.

#### Chwasty wrażliwe na środek w dawce w 2,5 l/ha:

chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita.

#### Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce w 2,5 l/ha:

chaber bławatek, fioltek polny, komosa biała, perz zwyczajny.

SKUTECZNY NA KAŻDYM POLU pola uprawne po zbiorze roślin, przed rozpoczęciem upraw poźniwnych, sady (jabłoń, grusza), użytki zielone, pola uprawne przed zbiorem zbóż, desykacja

#### DZIAŁA SZYBKO

objawy działania widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu

#### UŁATWIA LOGISTYKĘ

#### ZAWIERA WSPOMAGACZE



# AGENOR® 450 SL

herbicycyd

## ZAKRES STOSOWANIA

<b>Zawartość substancji czynnej</b>	<b>glifosat</b> (związek z grupy kwasów aminofosforowych) w formie soli izopropylamino- wej – <b>450 g/l (37,5%)</b>
<b>Zastosowanie</b>	<b>ZASTOSOWANIE ŚRODKA</b> <b>A. Pola uprawne przed zbiorem zbóż – zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru, desykacja.</b> <i>pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary.</i> <b>Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha</b> <b>Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha</b> <b>Desykacja</b> Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 7-14 dni przed przewidywanym zbiorem. <i>pszenica ozima</i> <b>Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha</b> <b>Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha</b> <i>pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary</i> <b>Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha</b> <b>Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha</b> Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 <b>B. Pola uprawne przed zbiorem roślin oleistych – zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru, desykacja.</b> <i>Rzepak ozimy</i> termin stosowania: Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej 30%. <b>Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha</b> <b>Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha</b> Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 <b>C. Pola uprawne po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw późniejszych – zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów.</b> <b>Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha</b> <b>Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha</b> Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 <b>D. Sady (jabłoń, grusza)</b> Termin stosowania: Środek można stosować od wiosny do lata, na intensywnie rosnące chwasty, które osiągnęły wysokość 15-20 cm. <b>Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha</b> <b>Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha</b> Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 <b>E. Użytki zielone</b> <b>Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha</b> <b>Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha</b> Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 <b>Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha</b>
<b>Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej</b>	okres karencji: NIE DOTYCZY



**HELM Polska Sp. z o.o.**  
Sprzedaż i Marketing środków ochrony roślin  
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa  
tel. 22 654 35 00, fax 22 654 83 10  
www.helmpolska.com