



## ALTIVATE® 6 WG

herbicyd

### PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

HERBICYD w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego, jesiennego i wiosennego zwalczania uciążliwych chwastów jednoliściennych w zbożach.

Środek zawiera substancję czynną mezosulfuron metylowy który pobierany jest głównie poprzez liście chwastów, w sposób ograniczony przez korzenie. Substancja czynna wykazuje działanie w pełni układowe, pobrana przez części nadziemne chwastów przemieszcza się w roślinach powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju a w konsekwencji ich zamieranie. Chwasty wrażliwe przestają rosnąć prawie natychmiast po aplikacji herbicydu. Całkowite zamieranie roślin następuje w ciągu 4-6 tygodni od zabiegu.

Sejfner (mefenpyr dietylu) zawarty w środku powoduje szybki rozkład substancji czynnej w roślinie uprawnej, podczas gdy rozkład tej substancji w chwastach przebiega dużo wolniej.

#### Chwasty wrażliwe

**zwalczane jesienią:** miotła zbożowa, wyczyniec polny,

**zwalczane wiosną:** owies głuchy, stokłosa bezostna, stokłosa żytnia, stokłosa płonna, życica wielokwiatowa, życica trwała, życica roczna.

**Uwaga:** środek stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Oliwar lub z innym adiuwantem o podobnym mechanizmie działania.

#### ELASTYCZNOŚĆ W STOSOWANIU

Herbicyd przeznaczony do stosowania jesienią i wiosną.

#### SKUTECZNIE ZWALCZA

UCIĄŻLIWE GATUNKI CHWASTÓW  
m.in. miotłę zbożową i wyczynca polnego.

#### NISKIE DAWKI

od 100 do 200 g/ha.



Miotła zbożowa (*Apera spica-venti*)



Wyczyniec polny  
(*Alopecurus myosuroides*)

# ALTIVATE® 6 WG

herbicyd

## ZAKRES STOSOWANIA

<b>Zawartość substancji czynnej</b>	<b>mezosulfuron metylowy</b> (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/kg (6%)
<b>Zastosowanie</b>	<p>Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.</p> <p><b>Pszemica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime</b> <b>Zwalczanie miotły zbożowej i wyczyńca polnego</b> <b>Jesienią:</b> <b>Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:</b> Altivate 6 WG 100 g/ha + Oliwar 0,4 l/ha <b>Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:</b> Altivate 6 WG 60-100 g/ha + Oliwar 0,3-0,4 l/ha Termin stosowania środka: opryskiwać jesienią na rosnące chwasty, od fazy 1 liścia do końca fazy 9 lub więcej liści (BBCH 11-25). Zalecana ilość wody: <b>200-400 l/ha.</b> Zalecane opryskiwanie: <b>średniokropliste</b> Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: <b>1</b> lub</p> <p><b>Zwalczanie wyczyńca polnego i wiechliny rocznej</b> <b>Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:</b> Altivate 6 WG 150 g/ha + Oliwar 0,6 l/ha <b>Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:</b> Altivate 6 WG 100-150 g/ha + Oliwar 0,4-0,6 l/ha Termin stosowania środka: opryskiwać jesienią na rosnące chwasty, od fazy braku rozkrzewień do końca fazy widocznego 5 rozkrzewienia (BBCH 20-25). Zalecana ilość wody: <b>200-400 l/ha.</b> Zalecane opryskiwanie: <b>średniokropliste</b> Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: <b>1</b></p> <p><b>Pszemica ozima, pszemica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare</b> <b>Zwalczanie wyczyńca polnego i wiechliny rocznej</b> <b>Wiosną:</b> <b>Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:</b> Altivate 6 WG 150 g/ha + Oliwar 0,6 l/ha <b>Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:</b> Altivate 6 WG 100-150 g/ha + Oliwar 0,4-0,6 l/ha Termin stosowania środka: opryskiwać wiosną na rosnące chwasty, od fazy widocznego 5 rozkrzewienia do końca fazy widocznego drugiego kolanka, co najmniej 2 cm nad pierwszym (BBCH 20-32). Zalecana ilość wody: <b>200-400 l/ha.</b> Zalecane opryskiwanie: <b>średniokropliste</b> Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: <b>1</b></p> <p><b>Pszemica ozima, pszemica jara</b> <b>Zwalczanie owsa głuchego, stokłosa bezostnej, stokłosa żytniej, stokłosa płonnej, życicy wielokwiatowej, życicy trwałej i życicy rocznej</b> <b>Wiosną:</b> <b>Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:</b> Altivate 6 WG 200 g/ha + Oliwar 0,8 l/ha <b>Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:</b> Altivate 6 WG 150-200 g/ha + Oliwar 0,6-0,8 l/ha Termin stosowania środka: opryskiwać wiosną na rosnące chwasty, od fazy widocznego 5 rozkrzewienia do końca fazy widocznego drugiego kolanka, co najmniej 2 cm nad pierwszym (BBCH 20-32). Zalecana ilość wody: <b>200-400 l/ha.</b> Zalecane opryskiwanie: <b>średniokropliste</b> Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: <b>1</b></p>
<b>Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji)</b>	Nie dotyczy



**HELM Polska Sp. z o.o.**  
Sprzedaż i Marketing środków ochrony roślin  
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa  
tel. 22 654 35 00, fax 22 654 83 10  
www.helmpolska.com