



## **RIMURON 25 WG**

### **herbicyd w kukurydzy i ziemniakach**

#### PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

HERBICYD selektywny o działaniu systemicznym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna rimsulfuron zaliczana jest do grupy B.

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylmleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów. Środek jest pobierany głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie do stożków wzrostu. Efekt chwastobójczy widoczny jest w okresie 7-20 dni po zabiegu. Najlepiej działa na chwasty roczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. kukurydza i ziemniaki rozkładają go do związków nieaktywnych.

... i chwasty znikają

#### **Chwasty wrażliwe**

chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, samosiewy rzepaku, szarlat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna

#### **Chwasty średniowrażliwe**

komosa biała, psianka czarna, rdest plamisty, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), rumianek pospolity, szczyr roczny

EKSTREMALNIE NISKA DAWKA  
od 20 g do 50 g na hektar

SELEKTYWNE DZIAŁANIE  
eliminuje konkretne gatunki  
chwastów

SZYBKI EFEKT  
efekt widoczny w 7-20 dni po  
zabiegu



# RIMURON 25 WG

herbicyd w kukurydzy i ziemniakach

## ZAKRES STOSOWANIA

<b>Zawartość substancji czynnej</b>	<b>rimсульфuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 250 g/kg środka (25%)</b>
<b>Zastosowanie</b>	<p><b>Kukurydza</b> <b>A. ZABIEG JEDNORAZOWY</b> Rimuron 50 g/ha + Helm Surfer 0,2 l/ha Zabieg wykonać w fazie 2-6 liści kukurydzy.</p> <p><b>B. ZABIEG DWUKROTNY (DAWKA DZIELONA)</b> pierwszy zabieg - w fazie 2-6 liści kukurydzy Rimuron 30 g/ha + Helm Surfer 0,2 l/ha drugi zabieg - po upływie 8-10 dni od pierwszego zabiegu Rimuron 20 g/ha + Helm Surfer 0,2 l/ha Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: <b>50 g/ha</b> Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: <b>20-50 g/ha</b> Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: <b>2</b> (w dawce dzielonej) Zalecana ilość wody: <b>200-400 l/ha</b> Zalecane opryskiwanie: <b>średniokropliste</b></p> <p><b>Ziemniak</b> <b>A. ZABIEG JEDNORAZOWY</b> Rimuron 50 g/ha + Helm Surfer 0,2 l/ha Zabieg wykonać w fazie 2-6 liści ziemniaka.</p> <p><b>B. ZABIEG DWUKROTNY (DAWKA DZIELONA)</b> pierwszy zabieg - w fazie 2-6 liści ziemniaka Rimuron 30 g/ha + Helm Surfer 0,2 l/ha drugi zabieg - po upływie 8-10 dni od pierwszego zabiegu Rimuron 20 g/ha + Helm Surfer 0,2 l/ha Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: <b>50 g/ha</b> Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: <b>20 -50 g/ha</b> Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: <b>2</b> (w dawce dzielonej) Zalecana ilość wody: <b>200 -400 l/ha</b> Zalecane opryskiwanie: <b>średniokropliste</b></p>
<b>Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej</b>	okres karencji: <b>NIE DOTYCZY</b>



**HELM Polska Sp. z o.o.**  
Sprzedaż i Marketing środków ochrony roślin  
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa  
tel. 22 654 35 00, fax 22 654 83 10  
www.helmpolska.com