



RIMURON 25 WG

herbicyd w kukurydzy i ziemniakach

PODSTAWOWE CECHY PRODUKTU

HERBICYD selektywny o działaniu systemicznym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna rimsulfuron zaliczana jest do grupy B.

Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntezy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów. Środek jest pobierany głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie do stożków wzrostu. Efekt chwastobójczy widoczny jest w okresie 7-20 dni po zabiegu. Najlepiej działa na chwasty roczne znajdujące się w fazie 2-3 liści. Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. kukurydza i ziemniaki rozkładają go do związków nieaktywnych.

... i chwasty znikają

Chwasty wrażliwe

chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, perz właściwy, samosiewy rzepaku, szarlat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna

Chwasty średniowrażliwe

komosa biała, psianka czarna, rdest plamisty, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), rumianek pospolity, szczyr roczny

EKSTREMALNIE NISKA DAWKA
od 20 g do 50 g na hektar

SELEKTYWNE DZIAŁANIE
eliminuje konkretne gatunki chwastów

SZYBKI EFEKT
efekt widoczny w 7-20 dni po zabiegu



RIMURON 25 WG

herbicyd w kukurydzy i ziemniakach

ZAKRES STOSOWANIA

Zawartość substancji czynnej	rimulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika) – 250 g/kg środka (25%)
Zastosowanie	<p>Kukurydza</p> <p>A. ZABIEG JEDNORAZOWY Rimuron 50 g/ha + Helm Surfer 0,2 l/ha Zabieg wykonać w fazie 2-6 liści kukurydzy.</p> <p>B. ZABIEG DWUKROTNY (DAWKA DZIELONA) pierwszy zabieg - w fazie 2-6 liści kukurydzy Rimuron 30 g/ha + Helm Surfer 0,2 l/ha drugi zabieg - po upływie 8-10 dni od pierwszego zabiegu Rimuron 20 g/ha + Helm Surfer 0,2 l/ha Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20-50 g/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (w dawce dzielonej) Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste</p> <p>Ziemniak</p> <p>A. ZABIEG JEDNORAZOWY Rimuron 50 g/ha + Helm Surfer 0,2 l/ha Zabieg wykonać w fazie 2-6 liści ziemniaka.</p> <p>B. ZABIEG DWUKROTNY (DAWKA DZIELONA) pierwszy zabieg - w fazie 2-6 liści ziemniaka Rimuron 30 g/ha + Helm Surfer 0,2 l/ha drugi zabieg - po upływie 8-10 dni od pierwszego zabiegu Rimuron 20 g/ha + Helm Surfer 0,2 l/ha Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 -50 g/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (w dawce dzielonej) Zalecana ilość wody: 200 -400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste</p>
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej	okres karencji: NIE DOTYCZY



HELM Polska Sp. z o.o.
Sprzedaż i Marketing środków ochrony roślin
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
tel. 22 654 35 00, fax 22 654 83 10
www.helmpolska.com